

julho 2017

LISTAGEM VACINAS ANTIRÁBICAS AUTORIZADAS PARA CÃES, GATOS E FURÕES

NOME	TITULAR AIM	DURAÇÃO DA IMUNIDADE	PROTOCOLO VACINAL
Eurican CHP-LR líofilizado e solvente para suspensão injetável (ex HEXADOG)	MERIAL Portuguesa – Saúde Animal, Lda.	Cães: 1 ano	Primovacinação: Uma injeção da vacina a partir dos 3 meses de idade. Revacinação: Anual.
Eurican CHPPi2-LR	MERIAL Portuguesa – Saúde Animal, Lda.	Cães: 1 ano	Primovacinação: Uma injeção da vacina a partir das 12 semanas de idade. Revacinação: Anual.
Nobivac Rabies, suspensão injetável destinada a cães, gatos, bovinos e equinos	MSD Animal Health, Lda.	Cães e gatos: 3 anos	Primovacinação: Aos 3 meses de idade. Revacinação: 3 anos.
Purevax Rabies suspensão injetável (Vacina para Gatos)	MERIAL	Gatos: 1 ano após a primovacinação; depois de 3 em 3 anos.	Primovacinação: Às 12 semanas de idade. Revacinação: 1 ano após a primovacinação e depois de 3 em 3 anos.
Rabdomun suspensão injetável para cães, gatos, bovinos e equinos (*)	ZOETIS PORTUGAL, LDA.	Cães: 3 anos Gatos: 2 anos	Primovacinação: Administrar 1 ml por via subcutânea, a partir dos 3 meses de idade. Os cães e gatos inoculados antes das doze semanas de idade devem ser revacinados nessa altura, ou o mais próximo possível. Revacinação: Cães: recomenda-se uma revacinação de 3 em 3 anos. Gatos: recomenda-se uma revacinação de 2 em 2 anos.

(*) Rabdomun – esta vacina encontra-se suspensa desde julho de 2016

julho 2017

LISTAGEM VACINAS ANTIRÁBICAS AUTORIZADAS PARA CÃES, GATOS E FURÕES

NOME	TITULAR AIM	DURAÇÃO DA IMUNIDADE	PROTOCOLO VACINAL
RABISIN Suspensão injetável	MERIAL PORTUGUESA - SAÚDE ANIMAL, LDA	<p>Cães e gatos: 1 ano após a primovacinação e depois de 3 em 3 anos</p> <p>Mustelídeos: 1 ano</p>	<p>Cães e gatos: Primovacinação: A partir das 12 semanas de idade.</p> <p>Revacinação: 1 ano após a primovacinação. No caso desta revacinação ser feita com a Rabisin, a partir daí, de 3 em 3 anos no máximo.</p> <p>Mustelídeos: Primovacinação: A partir dos 3 meses de idade.</p> <p>Revacinação: Anual</p>
RABIGEN MONO Solução injetável para cães e gatos	VIRBAC de PORTUGAL LABORATÓRIOS	<p>Cães e Gatos: 1 ano</p>	<p>Primovacinação: Uma única administração a partir dos 3 meses.</p> <p>Revacinação: Anual.</p>
Vacina Antirrábica, suspensão injetável para cães, gatos e bovinos	MEDINFAR-SOROLÓGICO – PRODUTOS E EQUIPAMENTO S, S.A.	<p>Cães e Gatos: 1 ano</p>	<p>Primovacinação: Administrar uma dose de vacina a partir da 12ª semana de vida.</p> <p>Revacinação: Anual.</p>

julho 2017

LISTAGEM VACINAS ANTIRÁBICAS AUTORIZADAS PARA CÃES, GATOS E FURÕES

NOME	TITULAR AIM	DURAÇÃO DA IMUNIDADE	PROTOCOLO VACINAL
Versican DHPPi/L3R, liofilizado e solvente para suspensão injetável para cães	ZOETIS PORTUGAL, LDA.	Cães: 1 ano	Primovacinação: A eficácia da valência contra a raiva foi comprovada após uma dose única a partir das 12 semanas de idade. Revacinação: Anual.
Versican Plus DHPPi/L4R, liofilizado e solvente para suspensão injetável para cães	ZOETIS BELGIUM SA	Cães: 3 anos	Primovacinação: A eficácia da valência contra a raiva foi comprovada em estudos laboratoriais após uma dose única a partir das 12 semanas de idade. No entanto, em estudos de campo, 10% dos cães seronegativos não fizeram seroconversão (> 0,1 UI/ml) 3-4 semanas após vacinação primária única contra a raiva. Alguns animais podem também não apresentar um título de anticorpos > 0,5 UI/ml após primovacinação única. O título de anticorpos diminui ao longo dos 3 anos de duração de imunidade, embora os cães estejam protegidos se infetados. No caso dos animais viajarem para áreas de risco ou para fora dos países da UE, o médico veterinário pode optar por administrar vacinação antirrábica adicional após as 12 semanas para assegurar que os animais vacinados têm um título de anticorpos ≥ 0,5 UI/ml, que é normalmente considerado como suficientemente protetor e assim cumprir os requisitos para os animais viajarem (título de anticorpos ≥ 0,5 UI/ml). Revacinação: Revacinação de 3 em 3 anos.

julho 2017

LISTAGEM VACINAS ANTIRÁBICAS AUTORIZADAS PARA CÃES, GATOS E FURÕES

NOME	TITULAR AIM	DURAÇÃO DA IMUNIDADE	PROTOCOLO VACINAL
Versican Plus Pi/L4R, liofilizado e solvente para suspensão injetável para cães	ZOETIS BELGIUM SA	Cães: 3 anos	Primovacinação: A eficácia da valência contra a raiva foi comprovada em estudos laboratoriais após uma dose única a partir das 12 semanas de idade. No entanto, em estudos de campo, 10% dos cães seronegativos não demonstraram seroconversão (> 0,1 UI/ml) 3-4 semanas após uma administração primária única contra a raiva. Outros 17% não apresentaram um título de anticorpos contra a raiva de 0,5 UI/ml, que é requerido por alguns países fora da UE para a entrada de animais. No caso dos animais viajarem para áreas de risco ou para fora dos países da UE, o médico veterinário pode optar por efetuar a primovacinação com duas doses que incluam a raiva, ou pode administrar uma vacinação antirrábica adicional após as 12 semanas. Revacinação: Revacinação de 3 em 3 anos
Vanguard R (*)	ZOETIS PORTUGAL, LDA.	Cães, Gatos e Furões: 1 ano após a primovacinação; depois de 2 em 2 anos	Primovacinação: A partir das 12 semanas de idade. A primovacinação é com uma dose única da vacina. Revacinação: 1 ano após a primovacinação; depois de 2 em 2 anos.
Versiguard Rabies	ZOETIS PORTUGAL, LDA.	Cães: 3 anos Gatos e Furões: 1 ano após a primovacinação; depois 2 anos	Primovacinação: A partir das 12 semanas de idade. A primovacinação é com uma dose única da vacina. Revacinação: Cães: 3 anos Gatos e Furões: 1 ano após a primovacinação; depois 2 anos

(*) Vanguard R - Mudou o nome para Versiguard Rabies e alterou o protocolo vacinal, a partir de julho 2016, sem efeitos retroativos.